

KTERÝ Z TĚCHTO PŘÍZNAKŮ VYSTIHUJE VAŠE OBTÍŽE?

POCIT **UNAVENÝCH** OČÍPOCIT **SUCHÝCH** OČÍPOCIT **PODRÁŽDĚNÝCH** OČÍ

ZÍSKEJTE KOMPLEXNÍ ÚLEVU OD PŘÍZNAKŮ SUCHÉHO OKA¹

Systane® COMPLETE pro klinicky ověřenou komplexní úlevu od příznaků suchého oka.¹

Vaše příznaky, naše řešení.

Příznaky suchého oka mohou být někdy matoucí. Mohou se pohybovat od mírného podráždění až po silné nepohodlí a projevují se různě – například slzením, bolestí, pálením nebo unavenýma očima.^{1,2}

To však komplikuje proces výběru kapek, které by vám poskytly takovou úlevu, jakou potřebujete. Systane® COMPLETE zvlhčující oční kapky, poskytují klinicky ověřenou komplexní úlevu od všech příznaků suchého oka.¹



**Komplexní úleva
se složením vše v jednom^{1,2}**

Pro zvládnutí víceroch
příznaků suchého oka



**1 kapka
až na 8 hodin úlevy²**

Pro rychlou a trvalou úlevu
od příznaků již od první kapky



Se silou HP-GUAR²⁻⁴

Složení Systane® se složkou
HP-Guar se přizpůsobí
jedinečným potřebám
vašich očí

Systane®

**Systane® je světově
spotřebitelská značka
číslo 1 umělých slz
z hlediska podílu prodeje
na trhu.⁵**

ZÍSKEJTE SKUTEČNOU ÚLEVU S NAŠÍ NABÍDKOU ŘEŠENÍ SUCHÉHO OKA

JAK ČASTO POCIŤUJETE PŘÍZNAKY SUCHÉHO OKA?

**1 AŽ 3x
BĚHEM TÝDNE**

VĚTŠINU ČASU

**TRPÍTE PŘÍZNAKY, KTERÉ
VYŽADUJÍ SPECIFICKOU ÚLEVU?**

např. stav po oční operaci, suché oko vyvolané jinými léky

NE

ANO

**Systane®
ULTRA**

**Systane®
COMPLETE**

**Systane®
HYDRATION**



Může se používat společně
s nošením kontaktních čoček.



Může se použít před nasazením kontaktních čoček
do oka nebo po jejich vyjmutí z oka.



Může se používat společně
s nošením kontaktních čoček.

Toto schéma je navrženo tak, aby zákazníkovi pomohlo s orientací při výběru vhodného produktu Systane v závislosti na uvedených faktorech. Schéma však neslouží pro účely diagnostiky.

Systane® je zdravotnický prostředek pro zmírnění příznaků suchého oka. Prosím podívejte se do návodu k použití ohledně bezpečnostních opatření, varování a kontraindikací.

Reference: 1. Bickle K et al. Ophthalmol Ther 13, 481–494 (2024) 2. Silverstein S et al. Clin Ophthalmol. 2020;14:3167-3177. 3. Kesavan S et al. Macromolecules. 1992;25(7):2026-2032. 4. Springs CL. Dev. Ophthalmol. 2010;45:139-147. 5. Based on internal analysis by Alcon using data from the following source: IQVIA Consumer Health Customized Insights Monthly, Consumer Health Category 07A3, US Dollar MnF - Market Share for the period MAT 11/2024 reflecting estimates of real-world activity in all countries where IQVIA reports such sales. Based on average rankings from 41 countries across South America, North America, Asia, and Europe. Copyright IQVIA. All rights reserved.